

## *Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag*

A.M. VAN HEMERT, G. VAN DER GLIND, A.J.F.M. KERKHOF, B. VERWEY, J. DE KEIJSER

[B.VANHEMERT@PARNASSIABAVOGROEP.NL](mailto:B.VANHEMERT@PARNASSIABAVOGROEP.NL)

### TOELICHTING

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 1.500 personen als gevolg van een suïcide. Daarnaast rapporteren ongeveer 400.000 volwassen personen suïcidegedachten en 110.000 een suïcidepoging in het voorgaande jaar. Van de laatsten komen ongeveer 12.500 personen voor behandeling in een algemeen ziekenhuis. Zorgprofessionals hebben een belangrijke rol in de herkenning en behandeling van suïcidaal gedrag en de preventie van suïcide. Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut voor Psychologie heeft een multidisciplinaire werkgroep van psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en huisartsen een richtlijn opgesteld voor de diagnostiek en de behandeling van suïcidaal gedrag. De richtlijn geeft zorgprofessional aanbevelingen voor het omgaan met suïcidaal gedrag in de dagelijkse praktijk.

### LEERDOEL

Aan het einde van de sessie kent de deelnemer de belangrijkste overwegingen en aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag in de klinische praktijk.